

本刊对来稿中表格编排处理的要求

- 1 表式** 采用三线表式，即顶线（粗线）、底线（粗线）和栏目线（细线），如有合计行或表达统计学处理结果的行，则在该行上再加1条分界横线。在纵栏头中，可根据分层需求加用非贯通性短横线。表格应具自明性。
- 2 版位** 先见文后见表。应通过文字引出表格，即在文稿正文的章节标题后，以文字说明作为承接，再排表格，如“××××。见表×”或“由表×可见……”。表格排在首次出现相关内容的自然段落后，上下正文与表、表与表之间空小5号字1行。表旁不串文。标目词居中。
- 3 表文题** 表文题位于表格上方。表序号，用阿拉伯数字连续编码，“表”字为小5号黑体，数字为Times New Roman体。1篇文章仅有1个表格，表序应为“表1”。表文题的中文文字采用小5号宋体，英文和数字为Times New Roman体。表文题与表序号之间留1字空，不加标点。表序号与表文题一起居中排。若表中所有参数的单位相同，单位可标注在表题之后（加括号）。各栏参数的单位不同，则应将单位符号加括号标注在各栏标目词后或下方。
- 4 排版** 横、纵标目间应有逻辑上的主谓语关系，主语（通常为“组别”）一般置表的左侧，谓语（通常为需要比较的指标）一般置表的右侧。表内横栏头文字以同层次第1个字为准，上下对齐，非每行居中排。横栏头中第2层次文字应缩1格排。表中纵栏同类项目的数字应以个位数（或小数点）或以范围号“~”、区间号“±”等符号为准，上下对齐，各行有效位数应相等。但同一纵栏中的各横栏数字表示各自独立的项目时，则可不用上下对齐，应按各自栏宽居中排。
- 5 表内容** 表格横径不应超过页边距左右各1 cm（即宽度不超过19 cm），更不可超过整版页面（即21 cm）。表内中文内容采用6号宋体，英文和数字为Times New Roman体，应1格1个数据。同一个表格中的同类数据保留的小数点位数应当一致，并与全文相应指标数据保留的小数点位数一致。表中上下左右相邻栏内文字或数字相同时，应重复排出。不可使用“同上”、“同右”或“”等字样或符号。也不可将空白项轻易写成“0”或以“—”线填空。因“0”代表实测结果为零，“—”代表未发现，空白项代表未测或无此项。若使用符号表示未测或未发现，应在表格线的下方以简练文字注释。
- 6 表格注释（表注）** 表注的中文内容采用6号宋体，英文和数字为Times New Roman体，排于表格底线左缘。表“注：”前空2字格，同一个表格不同内容的注释之间用“；”隔开，注释结束时加句号。注释用的角码符号一律采用单个右上角码的形式，按英文字母小写顺序选用a、b、c、d……在表中依先纵后横的顺序依次标出。
- 7 续表法** 表格长度在一页内排不下时，应选适合横行处断开，用细线封底，在次页上重排表头和剩余表身，但须在表头顶线上方加注“续表”字样，表序和表题则可省略。
- 8 竖表转栏法** 表格可从长度方向切断，平行地转排成2~3幅，幅与幅间以双细线分隔开，每幅纵向栏目重复排出。
- 9 横表分段法** 表格可从宽度方向断开，转排成上下重叠的2~3段，段与段间用双细线分隔，每段的横栏项目须重复排出。
- 10 参考表格样式** 常见表格设计样式见表1~6。

表 1 2 组人群一般情况比较 （人数）

组 别	人数	性 别		年 龄（岁）		工 龄（年）		饮 酒	
		男 性	女 性	≤30	>30	≤10	>10	有	无
接触组	94	83	11	28	66	47	47	9	85
对照组	86	77	9	35	51	52	34	12	74
χ ² 值		0.070		2.350		1.987		0.836	
P 值		0.792		0.125		0.159		0.361	
组 别	人数	喝 茶		吸 烟		接 受 医 疗 照 射		生 活 应 激 事 件	
		有	无	有	无	有	无	有	无
接触组	94	39	55	22	72	89	5	10	84
对照组	86	45	41	21	65	77	9	11	75
χ ² 值		2.119		0.025		1.658		0.202	
P 值		0.145		0.873		0.198		0.653	

表 2 2 组淋巴细胞亚群百分比比较 ($\bar{x} \pm s$, %)

组 别	人数	T 淋巴细胞	B 淋巴细胞	NK 细胞
对照组	86	67.98±9.36	11.41±3.99	19.64±9.42
接触组	94	66.62±9.85	10.67±4.42	21.88±10.22
<i>t</i> 值		−0.948	−1.169	1.527
<i>P</i> 值		0.345	0.244	0.128

表 3 淋巴细胞亚群影响因素的多元线性回归分析结果

影响因素	偏回归系数	标准误	标准化偏回归系数	<i>t</i> 值	<i>P</i> 值	95%可信区间
T淋巴细胞						
工频电磁场接触	−1.016	1.447	−0.053	−0.702	0.484	−3.873~1.840
工龄	1.701	1.843	0.088	0.923	0.358	−1.938~5.339
性别	5.291	2.313	0.173	2.287	0.023	0.724~9.858
年龄	−2.628	1.942	−0.131	−1.354	0.178	−6.461~1.205
饮酒	2.126	2.268	0.073	0.937	0.350	−2.350~6.602
喝茶	0.773	1.553	0.040	0.497	0.619	−2.293~3.838
吸烟	3.066	1.788	0.136	1.715	0.088	−0.464~6.596
接受医疗照射	−2.959	2.744	−0.083	−1.078	0.283	−8.376~2.459
生活应激事件	−1.353	2.321	−0.045	−0.583	0.561	−5.935~3.230
B淋巴细胞						
工频电磁场接触	−0.738	0.641	−0.087	−1.151	0.251	−2.003~0.527
工龄	−1.264	0.816	−0.149	−1.549	0.123	−2.876~0.347
性别	−0.426	1.025	−0.032	−0.416	0.678	−2.449~1.597
年龄	0.988	0.860	0.112	1.149	0.252	−0.710~2.685
饮酒	0.061	1.004	0.005	0.061	0.952	−1.922~2.044
喝茶	0.532	0.688	0.063	0.773	0.441	−0.826~1.890
吸烟	1.172	0.792	0.119	1.479	0.141	−0.392~2.735
接受医疗照射	1.195	1.216	0.076	0.983	0.327	−1.204~3.595
生活应激事件	−1.643	1.028	−0.125	−1.597	0.112	−3.672~0.387
NK细胞						
工频电磁场接触	1.777	1.484	0.090	1.197	0.233	−1.152~4.707
工龄	−0.587	1.890	−0.030	−0.310	0.757	−4.318~3.145
性别	−2.656	2.373	−0.085	−1.120	0.265	−7.339~2.027
年龄	1.509	1.991	0.073	0.758	0.450	−2.421~5.440
饮酒	−2.425	2.325	−0.081	−1.043	0.299	−7.015~2.166
喝茶	−1.515	1.593	−0.077	−0.951	0.343	−4.659~1.629
吸烟	−3.699	1.834	−0.160	−2.017	0.045	−7.319~−0.079
接受医疗照射	3.588	2.814	0.098	1.275	0.204	−1.968~9.144
生活应激事件	2.539	2.381	0.083	1.067	0.288	−2.160~7.239

注：自变量赋值：工频电磁场接触：不接触=0；接触=1；工龄：≤10 年=1；>10 年=2；性别：男性=1，女性=2；年龄：≤30 岁=1；>30 岁=2；饮酒、喝茶、吸烟、接受医疗照射、生活应激事件：无=0；有=1。

表 4 3 组大鼠染毒后 28 d 体质量及肺、肝、肾、脑脏器系数比较 ($\bar{x} \pm s$)

组 别	动物数 (只)	体质量 (g)	肺脏器系数 (g/kg)	肝脏器系数 (g/kg)	肾脏器系数 (g/kg)	脑脏器系数 (g/kg)
对照组	6	455.6±31.8	7.9±0.5	36.2±4.2	6.3±0.8	4.5±0.5
低剂量组	6	386.6±31.9 ^a	14.3±3.4 ^{ab}	36.0±2.3	6.6±0.9	5.0±0.5
高剂量组	6	3898.2±32.3 ^a	24.8±2.2 ^a	34.9±2.4	7.0±0.7	5.0±0.9

注：与对照组比较，^a*P*<0.05；与高剂量组比较，^b*P*<0.05。

表 5 131 株病原菌分布

病原菌类型	病原菌数 (株)	构成比(%)	病原菌类型	病原菌数 (株)	构成比(%)
G ⁺ 球菌			G ⁻ 杆菌		
葡萄球菌属			肠杆菌科		
金葡菌	43	32.8	粘质沙雷氏菌	5	3.8
腐生葡萄球菌 ^a	2	1.5	大肠埃希氏菌	4	3.1
黏膜球菌 ^a	2	1.5	产气大肠杆菌	3	2.3
微球菌 ^a	2	1.5	聚团肠杆菌	3	2.3
表皮葡萄球菌 ^a	1	0.8	奇异变形杆菌	3	2.3
其他凝固酶阴性葡萄球菌 ^a	12	9.2	伤寒沙门氏菌	3	2.3
肠球菌属			弯曲杆菌属		
肠球菌	3	2.3	弯曲菌	1	0.8
屎链球菌	1	0.8	真菌		
G ⁻ 杆菌			白色念珠菌	17	13.0
非发酵菌科			热带念珠菌	3	2.3
洛菲氏不动杆菌	7	5.3	其他非白色念珠菌	9	6.9
铜绿假单胞菌	4	3.1	合计	131	100.0
产碱假单胞菌	3	2.3			

注：^a血浆凝固酶阴性葡萄球菌。

表 6 2 组工人班前尿中 TMT 检测结果

组 别	总人数	测定值 (mg/L)		检出情况	
		范围	$M (P_{25}, P_{75})^a$	检出人数	检出率 (%)
接触组	124	<0.000 5~0.215 8	0.005 9 (0.001 8, 0.030 6) ^b	113	91.1 ^b
制粒岗位	23	0.001 7~0.215 8	0.049 7 (0.021 9, 0.076 8) ^d	23	100.0
破碎岗位	11	0.011 5~0.175 6	0.067 8 (0.051 5, 0.105 5) ^{cd}	11	100.0
押出岗位	16	0.005 9~0.106 5	0.023 9 (0.014 5, 0.032 9) ^d	16	100.0
组装岗位	74	<0.000 5~0.016 7	0.002 7 (0.001 2, 0.005 3)	63	85.1
对照组	25	<0.000 5~0.001 6	<0.000 5	2 ^e	8.0

注：^a个体尿中TMT水平小于检出限 0.000 5 mg/L者，以检出限的 0.5 倍水平为统计数据进行分析；与对照比较，^b $P<0.01$ ；与押出岗位比较，^c $P<0.01$ ；与组装岗位比较，^d $P<0.01$ ；^e对照组尿中检出TMT的 2 名工人，在日常工作中需经常到生产车间收集生产数据，尿中TMT分别为 0.000 8、0.001 6 mg/L。

《中国职业医学》编辑部

《中国职业医学》编辑部

投稿专用邮箱: zgzyyx@gdoh.org

联系电话: 020-84197595、34063079

联系地址: 广州市新港西路海康街 68 号

邮政编码: 510300